

REAKTIONSLOSER, PULSLOSER PATIENT

SCHWERES RHYTHMUSEREIGNIS, DRUCKLOS

HERZDRUCKMASSAGE

100-120/min - 5-6 cm Tiefe

Alarmierung Rea- bzw. Notfallteam, Notfallwagen holen > Defibrillator / AED (Fast-Patches) und Kapnometrie anbringen

NOCH NICHT INTUBIERT

BEUTELBEATMUNG ÜBER SUPRAGLOTTISCHE ATEMWEGSHILFE

Demandventil verwenden (wenn möglich)
oder Reservoirbeutel mit max. O₂-Flow

AF - 10/min

ALTERNATIVE: Maskenbeutelbeatmung
2 Atemhübe alle 30 HDMS (30:2)

Intubation nur durch Spezialisten | Dauer max. 10 Sekunden

INTUBIERT

BEUTELBEATMUNG

Demandventil verwenden (wenn möglich)
oder Reservoirbeutel mit max. O₂-Flow

AF - 10/min

RHYTHMUSANALYSE

DEFIBRILLIERBARER RHYTHMUS

Kammerflimmern / pulslose VT

NICHT DEFIBRILLIERBARER RHYTHMUS

Asystolie / pulslose elektrische Aktivität

